МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструкция
по медицинскому применению
лекарственного препарата

Вазоспонин

наименование лекарственного препарата (Vasosponinum)

Регистрационный номер: ЛП-000793

Торговое наименование: Вазоспонин

Международное непатентованное
или группировочное наименование:
Диоскореи ниппонской корневищ с корнями экстракт

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку
Активный компонент

Полиспонин (Диоскореи ниппонской корневищ с корнями экстракт) экстракт сухой с содержанием суммы фуростаноловых агликонов в пересчете на диосгенин и абсолютно сухое вещество 1,0 %	– 0,10 г

Вспомогательные вещества

Сахар молочный (лактозы моногидрат)	– 0,017 г
Крахмал картофельный	– 0,013 г
Магния оксид	– 0,007 г
Кальция стеарат	– 0,003 г
Масса таблетки	– 0,14 г

Описание
Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, от светло-коричневого
до коричневого цвета с более светлыми
и более темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа
Гиполипидемическое средство
растительного происхождения.

Код АТХ
[С10АХ].

Фармакологическое действие
Снижает уровень холестерина, повышает содержание фосфолипидов в крови и снижает коэффициент холестерин/фосфолипиды; снижает артериальное давление.

Показания к применению
Гиперхолестеринемия (легкая и умеренная). Атеросклероз сосудов головного мозга как в начальных его стадиях (в целях профилактики), так и при выраженных формах заболевания; при атеросклерозе сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью (в составе комплексной терапии).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

Применение при беременности
и в период грудного вскармливания
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

С осторожностью
Артериальная гипотония.

Способ применения и дозы
Внутрь. По 1–2 таблетки 2–3 раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20–30 дней с 7–10-дневными перерывами. Курс лечения 3–4 месяца.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции (кожный зуд), снижение аппетита, повышенное потоотделение.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются,
или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Взаимодействие с другими
лекарственными препаратами
Не установлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска
Таблетки 100 мг. По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку.
2, 3, 5 или 9 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 30 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация,
принимающая претензии потребителей:
ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия
Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.
Тел./факс: (495) 716–15–81, 716–15–90.
Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н,
п. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.